


Díky peru Caninsulin® VetPen® ...

nebyla léčba

CUKROVKY PSŮ A KOČEK

nikdy snadnější



► Vaše domácí zvíře má cukrovku

Zjištění, že váš oblíbený pes či kočka má cukrovku, může být zpočátku šokující, avšak uvědomme si, co tato diagnóza ve skutečnosti znamená. Jedná se o závažné onemocnění, které je dnes možné léčit pomocí několika drobných úprav denního režimu vašeho zvířecího společníka.

Váš veterinář vám naštěstí pro léčbu vašeho zvířete předepsal Caninsulin®, celosvětově nejspolehlivější veterinární inzulin. Pro snadnější aplikaci Caninsulinu vám váš veterinář doporučil inzulinové pero Caninsulin® VetPen®, moderní aplikační pomůcku vyvinutou se zřetelem na váš komfort.



Nejste v tom sami

Možná máte strach a obáváte se, jaký vliv bude mít cukrovka na život vašeho zvířecího společníka. Cukrovka domácích zvířat je však častější onemocnění než by se mohlo zdát. Mnozí majitelé zvířat již mají zkušenost s tím, co vy prožíváte v tuto chvíli.

Šance,

že pes nebo kočka

onemocní cukrovkou

jsou

1:100 až 1:500.



► Jak vzniká cukrovka

Během trávení se potrava rozkládá na menší částice, které tělo dále zpracovává. Sacharidy se rozkládají na různé cukry, mezi něž patří i glukóza. Glukóza je ze střev vstřebávána do krve, odkud zásobuje buňky těla potřebnou energií.

Aby mohly buňky glukózu řádně využívat, musí být přítomen hormon zvaný inzulin. Pokud není inzulinu dostatek k naplnění potřeb organismu, glukóza zůstává v krevním řečišti a buňky nejsou dostatečně zásobeny energií. To vše vede k vzniku syndromu označovaného jako diabetes mellitus. Diabetes mellitus nebo také cukrovka je tedy způsobena nedostatkem inzulinu.

CUKROVKU JE MOŽNÉ ZVLÁDNOUT

Cukrovku obvykle není možné vyléčit, avšak je možné ji úspěšně zvládat tak, aby zvíře mohlo vést normální život. Váš veterinář vám vysvětlí vše, co potřebujete vědět pro dobrou péči o zvíře trpící cukrovkou.

► Odkud se bere inzulin

Inzulin je hormon produkovaný buňkami ve slinivce. U diabetických psů a koček tyto buňky neprodukují dostatečné množství inzulinu, které by pokrylo potřebu organismu. Jakmile nastane takováto situace, buňky nejsou dostatečně zásobovány glukózou a nevyužitá glukóza se začne hromadit v krevním řečišti. Pravidelné podávání inzulinu však naštěstí může u vašich zvířat pomoci zabránit vzniku takové situace.

**Při vhodné regulaci
mohou vést diabetická zvířata
plnohodnotný život**



Nyní se dodává
ve dvou velikostech:

- 0,5 IU/8 IU pro zvýšenou přesnost dávkování
- 1 IU/16 IU pro zvýšené objemy dávek

► Příznaky cukrovky u psů a koček

Cukrovka a její příznaky vznikají v důsledku vysoké koncentrace glukózy v krvi zvířete. Možná jste si povšimli příznaků, jako je častější močení, větší chuť k jídlu či žízeň nebo úbytek hmotnosti navzdory velké chuti k jídlu. Ačkoliv tyto příznaky mohou vést k domněnce, že vaše zvíře trpí cukrovkou, tuto diagnózu může potvrdit jedině veterinární lékař. Ke komplikacím cukrovky u psů patří zakalený zrak poukazující na šedý zákal, který může způsobit i ztrátu zraku. Kočky trpící cukrovkou mají obvykle matnou a suchou srst, neboť si ji řádně nečistí. U koček může cukrovka způsobit také potíže s chůzí, kdy zasahuje především pánevní končetiny.

ČEMU JE TŘEBA VĚNOVAT POZORNOST:



Častější močení



Velká žízeň nebo zvýšená spotřeba vody



Zvýšená chuť k jídlu



Úbytek hmotnosti navzdory velké chuti k jídlu



Caninsulin®
VetPen®

Stanovení diagnózy cukrovky psů a koček

Váš veterinární lékař potvrdí diagnózu cukrovky poté, co provede potřebné vyšetření a laboratorní testy. Diagnóza cukrovky je stanovena v případě, že je zjištěna zvýšená koncentrace glukózy v krvi i v moči.



► Podávání Caninsulinu®

Váš veterinární lékař stanoví dávku Caninsulinu® pro vašeho psa či kočku a naučí vás, jak jej aplikovat pomocí pera VetPen®. Po několika týdnech léčby veterinář zkontroluje průběh onemocnění, změří glukózu v krvi a případně upraví dávku Caninsulinu® tak, aby byla zajištěna maximální kontrola onemocnění.

Caninsulin® je nutné podávat podle pokynů, jinak se mohou znovu objevit příznaky onemocnění a vzniknout komplikace. Jakmile je však onemocnění zvládáno pomocí Caninsulinu®, většina zvířat je schopna vést plnohodnotný život stejně jako zvířata, která cukrovkou netrpí.

Caninsulin® VetPen®

JEDNODUCHÝ ZPŮSOB KTERÝ POMÁHÁ ZVLÁDAT CUKROVKU DOMÁCÍCH ZVÍŘAT

1



**Nastavte
předepsanou dávku
Caninsulinu®**

2



**Pro aplikaci
stiskněte
uvolňovací tlačítko
a 5 vteřin podržte**



► Péče o vašeho psa či kočku

Každodenní péče o vaše domácí zvíře je stanovena podle denní dávky potřebné energie, takže je vhodné, aby krmení i každodenní aktivity byly pokud možno neměnné. Snažte se krmit stejnými dávkami stejného krmení ve stejnou denní dobu. Stejný postup dodržujte u každodenního cvičení. Každý den chodte na stejně dlouhé vycházky nebo cvičte stejně dlouhou dobu. Nezapomínejte, že klíčem k udržení glukózy pod kontrolou a k potlačení příznaků cukrovky je důslednost.

DROBNÉ ZMĚNY, KTERÉ MOHOU HODNĚ ZNAMENAT

- Požádejte svého veterinárního lékaře o krmivo pro diabetiky
- Požádejte členy rodiny a své blízké, aby stejně jako vy nedávali zvířeti sladké pamlsky
- Sledujte u svého zvířete chuť k jídlu, spotřebu vody a fyzickou aktivitu. Pokud to váš veterinární lékař nařídí, sledujte koncentraci glukózy v krvi a v moči.



► Jak se vyhnout komplikacím

Nejčastějším vedlejším účinkem léčby inzulinem je příliš nízká koncentrace glukózy v krvi, která se též nazývá hypoglykémie. Hypoglykémie může mít smrtelné následky. Naštěstí jí můžeme úspěšně zabránit, neboť víme, co ji způsobuje:

- Podání příliš velkého množství inzulinu
- Změna typu krmiva
- Změna množství krmiva
- Přílišná fyzická zátěž
- Onemocnění

HYPOGLYKÉMIE: KDYŽ JE V KRVÍ PŘÍLIŠ MÁLO GLUKÓZY

Príznaky hypoglykémie se mohou objevit náhle a patří k nim:

Slabost	Záškuby svalů
Deprese	Záchvaty
Špatná koordinace	Koma
Letargie	

► Jak se zachovat v případě hypoglykémie

POKUD JE VAŠE ZVÍŘE PŘI VĚDOMÍ:

1. Naneste si malé množství glukózy (např. ve formě glukózového prášku) na prst a vetřete ji do dásní. (Nesnažte se přinutit svoje zvíře k příjmu potravy, mohlo by dojít k udušení.)
2. Glukóza se vstřebává velmi rychle (1 až 2 minuty). Poté by vaše zvíře mělo začít reagovat.
3. Jakmile začne zvíře reagovat a posadí se, dejte mu menší množství krmiva.
4. Jakmile pomine bezprostřední ohrožení, zavolejte svému veterináři a poraďte se, zda máte přijít na kontrolu.

POKUD JE VAŠE ZVÍŘE V BEZVĚDOMÍ NEBO MÁ ZÁCHVAT:

1. OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE SVÉHO VETERINÁŘE – JEDNÁ SE O VELMI VÁŽNÝ STAV!
2. Postupujte dle pokynů v předchozím odstavci.



► Caninsulin® VetPen® vám může pomoci zvládat cukrovku vašeho domácího zvířete

Díky moderní technologii pera Caninsulin® VetPen® nebyla nikdy péče o psa nebo kočku s cukrovkou snadnější. Toto pero bylo vyvinuto s ohledem na váš komfort, je tedy uzpůsobeno tak, aby dávkování a aplikace inzulínu byla jednodušší, rychlejší, pohodlnější a přesnější, takže s ní máte mnohem méně starostí. Věřte, že díky peru Caninsulin® VetPen® bude i pro vašeho zvířecího společníka snazší toto onemocnění snášet. Pro vás to znamená mnohem snazší úkol při péči o něj. Máte-li zájem o další informace, obraťte se prosím na:

www.pet-diabetes.com

www.petdiabetesmonth.com.