

Myxomatóza a mor králíků jsou vážné, běžně se vyskytující infekce králíků. V tomto letáku naleznete potřebné informace o obou infekcích a o možnostech prevence před nimi.

Jaké jsou příznaky nemoci?

Myxomatóza je virové onemocnění, jehož prvními příznaky jsou tekutinou naplněné otoky v oblasti tváře a hlavy. „Ospalé oči“, nateklé pysky, drobné otoky na vnitřní straně boltců a otok v oblasti řitního otvoru a genitálií jsou dalšími klasickými příznaky. Během jednoho dne se může stav zhoršit natolik, že otoky mohou způsobit slepotu zvířete. Zvíře není schopno přijímat potravu ani pít a hyne do 12 dní po infekci.

Mor králíků je také onemocnění virového původu, i když původce je odlišný od viru způsobujícího myxomatózu. Průběh onemocnění se může výrazně lišit. Většina králíků hyne rychle, bez výrazných klinických příznaků, vyjma letargie trvající několik hodin. Králíci, kteří přežijí delší dobu mají horečku a pozorujeme u nich křečové stavy, které se neustále zhoršují. Poté upadnou do kómatu a onemocnění podlehnou za 12–36 hodin.

Je můj králík ohrožen?

Myxomatóza i mor králíků jsou nebezpečné pro všechny druhy králíků, včetně těch divoce žijících, a vyskytují se ve všech regionech naší země.



Jak se infekce šíří?

Myxomatóza se šíří krev sajícím hmyzem, jako jsou králíčí blechy a komáři. Přes zimu virus přežívá v krvi hibernujících blech. Bohužel je virus přenášen i přímým kontaktem nemocného zvířete se zdravým. Proto nelze zabránit šíření viru pouhou ochranou před hmyzem.

Virus moru králíků je vylučován močí a sekrety dýchacího traktu nemocných zvířat. Zdraví králíci se tak mohou nakazit přímým kontaktem s nemocným králíkem a nebo nepřímo z prostředí. V něm odolný virus přežívá i několik měsíců a králíček se poté může nakazit předměty infikovanými virem jako například oblečením, kotcem, vodou nebo miskami na krmivo.

Jak dlouhá je inkubační doba?

U myxomatózy je období od infekce do prvních projevů onemocnění dlouhé přibližně 5–14 dnů. U moru králíků je průběh perakutní s inkubační dobou maximálně 3 dny.

Ovšem u této infekce se mnohdy nemusíme setkat s žádnými klinickými příznaky a králíci hynou rychle bez jakýchkoliv projevů onemocnění.

Jak dlouho po infekci mohou králíci přežít?

V případě myxomatózy je doba přežívání od několika týdnů do několika měsíců po nakažení, avšak v případě těžké infekce hynou zvířata do 12 dnů v důsledku zápalu plic. Ne všichni

infikovaní králíci hynou – v přírodě přežívá do 10 % infikovaných zvířat. Avšak i přes dokonalou péči může být myxomatóza zdlouhavé a nepříjemné onemocnění vedoucí k tvorbě strupů a jizev zejména na hlavě. Naopak u moru králíků dochází k úhynu mnohem rychleji, obvykle do 12–36 hodin od propuknutí prvních příznaků. V mnoha případech však nemusíme nic kromě letargie a skleslosti pozorovat.

Jak lze s infekcemi bojovat?

Existují dvě metody:

- Kontrola parazitů (zejména v případě myxomatózy)
- Vakcinace proti oběma onemocněním

Prevence před hmyzem

Myxomatóza se šíří krev sajícím hmyzem. Z toho důvodu je stěžejní ochrana Vašeho králíčka před blechami. Držte jej stranou od divokých králíků nebo králíků, kterým se nedostává takové péče jako tomu Vašemu. Používejte prostředky proti blechám, jako jsou spot on přípravky nebo spreje. Ochrana před komáry je složitější, ale lze jí docílit pomocí repelentních pásků, sítí do oken či elektrických odpařovačů. Suchá podestýlka komáry také odrazuje.

Vakcinace

Na trhu existuje vakcína, která chrání jak proti myxomatóze, tak proti moru. Jediná dávka zajistí imunitu proti oběma infekcím po dobu jednoho roku! Králíčka je nutné revakcinovat každý rok. Zeptejte se na tuto vakcínu Vašeho veterinárního lékaře.



Vakcinace
vašeho králíka
je důležitá



www.msd-animal-health.cz



11-2012-176-NMYX-CZ-PB-11-2014